

Pikat kryesore rreth Metodave hormonale të Planifikimit Familjar

Kontraktivët Oralë të Kombinuar (KOK), injeksionet mujore, Injeksionet afatgjata, (NET-EN and DMPA), implante, pilulat vetëm me progestin (PVP)

Kur duhet të fillohen metodat hormonale				
Një grua mund të fillojë metodat hormonale kontraktive ne çdo kohë që ajo është e sigurtë se nuk është shtatzënë, psh:				
	Pasi fillojnë menstruacionet	Nëse ushqen foshnjën me qumësht gjiri	Pas lindjes nëse nuk ushqen foshnjën me gj	Kur kalon nga një metodë në tjetrën
KOK	Në 5 ditët e para	Deri në 6 muaj*	Në javën e 3-të	Menjëherë, nëse metoda e më parëshme është përdorur korrekt.
Injeksionet mujore	Në 7 ditët e para			
Injeksionet afatgjata, implantet	Në 7 ditët e para	Javën e 6 pas lindjes	Në çdo kohë pas 4 javësh	
PVP	Në 5 ditët e para			
Gruaja mund të fillojë metodat kontraktive hormonale në çdo kohë si më poshtë:				
<ul style="list-style-type: none"> Ajo nuk ka kryer seks që prej periodave të fundit apo lindjes së fundit Ajo ka lindur një foshnjë 6 muajt e fundit, dhe që atëherë nuk i kanë ardhur periodat, dhe ajo ushqen VETËM me gj foshnjën Ajo ka bërë një abort 7 ditë më parë 				

*Nëse ushqen pjesërisht me gj foshnjën, pas 6 javësh

Pyesni klienten nëse ka ndonjë problem serioz shëndetësor			
Nëse klientja ka ndonjë nga këto kushtemund ajo te perdore...?		
	KOK, injeksionet mujore	Injeksionet afatgjata	Implantet, POP
Presion të lartë gjaku (nëse keni mundësi matjani)	JO nqs ≥ 140/90	JO nqs ≤ 160/100	PO
Ajo thotë se ka presion të lartë gjaku (presioni i gjakut nuk mund të matet)	JO	PO	PO
Pi duhan dhe është 35 vjeç apo më shumë	JO*	PO	PO
Sëmundje serioze të mëlçisë: cirrozë, hepatit, tumor	JO	JO	JO
Migrenë dhe është 35 vjeç apo më shumë, ose migrenë me aura në çdo moshë	JO	PO	PO
Diabet për më shumë se 20 vjet	JO	JO	PO
Mpiksje gjaku në venat e thella të këmbëve (DVT)	JO nqs ka patur DVT	JO	JO
Nëse ka pasur probleme serioze të zemrës apo atak të zemër	JO	JO	PO
Sëmundje të fshikëzës së tëmthit	KOK: JO Injeksione mujore: PO	PO	PO
Nëse ka pasur ndonjëherë kancer të gjirit	JO	JO	JO

*Për injeksionet mujore, PO nëse pihen më pak se 15 cigare në ditë



Korrigjimi i keqkuptimeve

KUR NJË GRUA KA HARRUAR TË PIJË KOK:

Koncept themelor: Të rrih një numër ditësh pa pirë pilulat hormo-nalerrit rezikun për shtatzëni. Rreziku më i madh vjen nga zgjatja e javës pushim të pilulave hormonalenga njëri cikël në tjetrin.

Tregoji asaj se çfarë duhet të bëjë:

- Nëse harroni ndonjë nga pilulat hormonale, gjithmonë merrni një kokërr menjëherë sapo jeni kujtuar. Merrni nga një kokërr çdo ditë. Nëse harroni një apo dy kokrra, kjo është gjithçka që duhet të bëni.
- Filloni në kohë pakon e re të pilulave—edhe nëse keni harruar të pini disa nga 7 pilulat e fundit nga paketa me 28 pilula.
- Nëse ju harroni të pini 3 apo më shumë pilula (midis 21 pilulave të para) apo nëse ju filloni një paketë 3 ditë me vonesë apo më shumë: Filloni të merrni përsëri pilulat. Njëkohësisht përdorni prezervativë apo shmangni seksin për 7 ditë.
- Dhe nëse ju harroni të pini 3 apo më shumë pilula javën e 3-të të paketës: Filloni të merrni përsëri pilulat. Përdorni prezervativë apo shmangni seksin për 7 ditë.
- Njëkohësisht, filloni një paketë të re ditën tjetër pas javës së 3-të të pilulave (Hidhni çdo pilulë të javës së 4-tërt)

RREGULLAT NËSE VONOHET BËRJA E INJEKSIONIT:

Pas sa kohësh duhet grua të bëjë injeksionin?

- Për DMPA është në rregull nëse behët deri në 4 javë vonesë
- Për NET-EN është në rregull nëse bëhet deri në 2 javë vonesë
- Injeksionet mujore janë në rregull nëse bëhen deri në 1 javë vonesë

PILULAT KONTRACEPTIVE TË URGJENCËS:

- Merrni sa më shpejt të jetë e mundur brenda 5 ditësh pas marrëdhënies seksuale të pambrojtur.
- Doza: Nëse ka, 1.5 mg levonorgestrel në një dozë të vetme (produkt i dedikuar, ose 40 apo 50 PVP). Ose nëse keni KOK, 0.5 mg levonorgestrel + 0.1 mg ethinyl estradiol; të përsëritura pas 12 orësh.

Menaxhimi i Efekteve të Zakonshme Anësore

Zakonisht, qetësimi i klientes është i mjaftueshëm. Efektet Anësore nuk janë të rezikshme. Shpeshherë kalojnë vetë.

- Nuk ka perioda mujore: sigurojeni klienten se nuk ka nevojë për trajtim. Nuk është shenjë e shtatzënisë nëse metoda përdoret korrekt.
- Dhimbje e lehtë koke, gjokse të tendosura: Përdorni lehtësues të zakonshëm të dhimbjes. (Nëse ka dhimbje të migrenës, referojuni udhëzuesit të ofruesit për sqarime.)
- Gjakkrrjedhje e çregullt apo e shtuar: Për lehtësim të shenjave përdorni një nonsteroidal mjekim kundër infeksionit (NSAID), të tillë si ibuprofen 800 mg 3 herë në ditë për 5 ditë. Mos lini pa pirë KOK apo PVP.
- Shqetësime të stomakut ndërkohë që përdorni KOK apo PVP: Merrni pilulat para kohës së gjumit apo duke ngrënë ushqimin.

